

Tab. 3. Očkovací kalendář pro dospělé (upraveno podle 11)

| Nemoc                                                                                                       | 18–26 let                                                         | 27–49 let | 50–59 let | 60–64 let                                         | 65 a více let | Přeočkování                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Tetanus<br>(také při úrazech)                                                                               | po 10–15 letech                                                   |           |           | booster po 10 letech                              |               | booster po 10–15 letech                    |
| Černý kašel<br>(zejm. rodinné kontakty dětí do 1 roku a těhotné ženy)                                       | min. 1 dávka v průběhu dospělosti                                 |           |           |                                                   |               | po 10–15 letech                            |
| Neštovice<br>(vnímaví jedinci, práce v riziku, rizikovní pacienti)                                          | 2 dávky                                                           |           |           |                                                   |               | nestanoveno                                |
| Virová hepatitida A<br>(vnímaví jedinci, práce v riziku, rizikové chování)                                  | 2 dávky                                                           |           |           |                                                   |               | nestanoveno                                |
| Virová hepatitida B<br>(vnímaví jedinci a osoby neočkované v dětství, rizikovní pacienti, rizikové chování) | 3 dávky                                                           |           |           |                                                   |               | nestanoveno                                |
| Lidské papilomaviry<br>(muži i ženy, bez věkového omezení)                                                  | 3 dávky                                                           |           |           |                                                   |               | nestanoveno                                |
| Pásový opar                                                                                                 |                                                                   |           | 2 dávky   |                                                   |               |                                            |
| Klíšťová encefalitida<br>(rizikové skupiny, práce v riziku)                                                 | 3 dávky základní schéma, 4. dávka po 3 letech, další po 5 letech* |           |           | 3 dávky základní schéma, přeočkování každé 3 roky |               | po 3 nebo 5 letech                         |
| Pneumokokové nákazy<br>(hrazeno pro osoby nad 65 let a rizikové pacienty aj.)                               | dle platných doporučení                                           |           |           |                                                   |               | dle platných doporučení                    |
| Meningokokové nákazy<br>(rizikové skupiny, práce v riziku, cestovatelé, osoby se zdravotní indikací)        | 2 dávky MenB<br>1–2 dávky MCV4                                    |           |           |                                                   |               | podle SPC jednotlivých vakcín              |
| Chřipka<br>(zvláště osoby v riziku a rizikové skupiny)                                                      | 1 dávka                                                           |           |           |                                                   |               | každoročně                                 |
| Onemocnění vyvolané <i>Haemophilus influenzae</i> typu b<br>(rizikové skupiny)                              | 1 dávka                                                           |           |           |                                                   |               | nestanoveno                                |
| Vzteklina<br>(cestovatelé, rizikové skupiny, práce v riziku)                                                | 5 dávek postexpozičně, 2–3 dávky preexpozičně                     |           |           |                                                   |               | dle SPC vakcíny                            |
| Spalničky<br>(zdravotníci dle legislativy, cestovatelé)                                                     | 1 dávka                                                           |           |           |                                                   |               | dle SPC vakcín                             |
| Respirační syncytiální virus<br>(osoby nad 60 let, těhotné ženy)                                            |                                                                   |           |           | 1 dávka                                           |               | dle SPC vakcín                             |
| Covid-19                                                                                                    | 1 dávka                                                           |           |           |                                                   |               | u rizikových skupin, nejméně po 3 měsících |

Výsvětlivky:  
\*platí pro vakcínu FSME-IMMUN, u vakcíny Encepur se přeočkovává po 3 letech již od 50 let věku  
MenB: meningokok séro skupiny B, MCV4: meningokoky séro skupin A, C, W135, Y  
červeně: doporučeno v přítomnosti rizikových faktorů či ve specifických případech

zdravotního pojištění všem osobám starším 50 let (viz § 30 výše).

Očkování proti **pneumokokovým nákažám** je (podle § 30 výše uvedeného zákona a Metodického postupu s platností od 1. 7. 2024) hrazeno ze zdravotního pojištění kojencům (Prevenar 13, Vaxneuvance, Apexxnar/Prevenar 20), osobám v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech po seniory a v domovech pro osoby se zdravotním postižením (Prevenar 13, Vaxneuvance, Apexxnar/Prevenar 20), rizikovým pacientům a osobám starším 65

Tab. 4. Možná tolerance při jednorázovém promeškání dávky základního schématu či přeočkování klíšťové encefalitidy u imunokompetentních osob (13)

| Prodlení            | Možná tolerance |
|---------------------|-----------------|
| mezi 1. a 2. dávkou | max. 12 měsíců  |
| mezi 2. a 3. dávkou | max. 3 roky     |
| 4. či další dávky   | max. 10 let     |

let (Prevenar 13, Vaxneuvance, Apexxnar/Prevenar 20, Pneumovax 23) (14, 15).

Očkování proti infekčním **hepatitidám typu A, resp. A a B** patří k základní prevenci před cestami do zahraničí, nákaza ale hrozí i ČR. Zdravotníci a občané narození

v ČR v roce 1989 a později by měli být proti hepatitidě B již očkovaní. Plošná vakcinace kojenců (kombinovanou vakcínou) a současně doočkování tehdy 12letých dětí (vakcínou Engerix B10) totiž bylo zahájeno v roce 2001 (1, 16).