

Podpořme společně



Janské Lázně
zpět do života

krok za krokem

Speciální výzva určená pro lékaře: Společnou chůzi podpoříme nejen své vlastní zdraví, ale také pomůžeme zlepšit stav pacientů po úrazu nebo nemoci v Janských Lázních. Každým krokem přispějeme na podporu rehabilitace a obnovy zdraví pacientů v lázních.




Období
od 1. 10. 2024
do 30. 11. 2024



Aktivity
chůze
běh



Částka
50 000 km = 50 000 Kč
pro Janské Lázně



MUDr. Šimon Kozák
ambulance Léčba bolesti, Praha

„Při práci s klienty je pohyb podstatnou esencí mých doporučení a shoduje se i s mým životním nastavením. Líbí se mi charitativní nádeh tohoto projektu a současně to považuji za skvělou osvětu o algeziologii jako takové.“

**PARTNER
PROJEKTU:**



GEDEON RICHTER
Health is our mission




Více informací o projektu naleznete na webu <https://spolecneprozdravi.cz/>



BIOFENAC®
aceclofenac

Léčba bolesti a zánětu
2x denně 100 mg



Zkrácená informace o přípravku Biofenac 100 mg potahované tablety, Biofenac 100 mg prášek pro perorální suspenzi. Složení: 100 mg aceclofenacu v 1 tbl/sáčku. **Indikace:** Symptomatická léčba bolesti a zánětu při OA, RA, AS. **Dávkování:** Biofenac tablety je určen k p.o. podání, nutno zapít. Obsah sáčku rozpustíte ve 40-60 ml vody, ihned vypít. Možno užívat s jídlem. Max. dop. dávka 200 mg denně jako dvě oddělené dávky po 100 mg. **Kontraindikace:** Precitlivělost na aceklofenak nebo kleroukolí pomocnou látku přípravku; pacienti, u kterých látky s podobným účinkem vyvolávají astmatický záchvat, bronchospasmus, akutní rinitidu nebo kopřivku; pacienti precitlivělí na tyto látky; aktivní krvácení nebo poruchy krvetvorby; v anamnéze GIT krvácení nebo perforace v souvislosti s NSAIDs; aktivní nebo rekurentní peptický vřed/krvácení v anamnéze; závažné srdeční selhání (NYHA II-IV), ICHS, periferní arteriální onemocnění a/nebo cerebrovaskulární onemocnění; závažná jaterní/renální insuficience, poslední 3 měsíce těhotenství. **Upozornění:** Nepodávat současně s jinými NSAIDs. V souvislosti s NSAIDs byla hlášena retence tekutin a otoky, GIT krvácení, ulcerace nebo perforace. Pacienti s NYHA I, významnými rizikovými faktory pro vznik KV příhod, s cerebrovaskulárním krvácením v anamnéze, mají být léčeni aceklofenakem pouze po pečlivém zvážení. Podávání NSAIDs může způsobit snížení tvorby PGE a uspošit renální selhání. Účiti NSAIDs u pacientů s jaterní porýlní může vyvolat její ataku. Aceklofenak může reverzibilně inhibovat agregaci trombocytů. Je třeba opatrnosti při podávání pacientům s mírným nebo středně těžkým poškozením jater nebo ledvin, s bronchiálním astmatem; v anamnéze s SLE, porýlní, hematopoetickou nebo koagulační poruchou, u pacientů starších a léčených současně léky, které mohou zvýšit riziko ulcerace a krvácení, s příznaky GIT onemocnění. Přípravek má být vsazen při prvním výskytu kožní vyrážky nebo slizniční léze. Plané neštovice mohou spustit závažné infekční komplikace kůže a měkkých tkání. Přípravek obsahuje aspartam a sorbitol. **Interakce:** Aceklofenak může být inhibitor cytochromu P450 2C9. Některé vhodné kombinace s methotrexátem, lithiem a digoxinem, kortikosteroidy, antikoagulanty, protidětkovými látkami a SSRI. Opatření nebo úprava dávky může být potřebná u kombinace: methotrexát, cyklosporin, takrolimus, ostatní NSAIDs, steroidy, salicyláty, diuretika, ACE inhibitory a sartany, kalium šetřícími diuretika, antidiabetika, zidovudin. **Těhotenství a kojení:** Od 20. týdne těhotenství může užívání aceklofenaku způsobit oligohydramnion v důsledku poruchy funkce ledvin u plodu a ve druhém trimestru byly hlášeny případy konstrikce ductus arteriosus. Většina těchto stavů po ukončení léčby odezní. Z těchto důvodů nemá být během prvního a druhého trimestru těhotenství přípravek Biofenac podáván, pokud to není absolutně nutné. Pokud přípravek Biofenac užívá žena v době, kdy se snaží otehotnět, nebo během prvního a druhého trimestru těhotenství, má užívat co nejnižší dávku po co nejkratší dobu. Rozhodnutí o užívání během kojení je třeba udělat s ohledem na přínos kojení pro dítě a přínos léčby přípravkem Biofenac pro ženu. Biofenac je kontraindikovaný ve 3. trimestru těhotenství. **Nežádoucí účinky:** GIT - peptické vředy, perforace nebo krvácení, nauzea, průjem, flatulence, obštipace, dyspepsie, bolest břicha, melena, hemateméza, ulcerózní stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnovy choroby, gastritida. Dále byl hlášen edém, hypertenze a srdeční selhání. **Uchovávání:** V původním obalu při teplotě do 25°. **Balení:** 20, 60 potahovaných tablet v blistru a krabice. 20 sáčku s obsahem jedné dávky v krabici. **Držitel registrace:** Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21, 1103 Budapest, Maďarsko. **Registrační číslo:** potahované tablety: 29/445/11-C, sáčky: 29/446/11-C. **Datum schválení:** 7.7.2011. **Věřujte, prosím, pozornost změněm v SPC/Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek ve formě tablet je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Přípravek ve formě prášku není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznámte se, prosím, se Souhrnem informací o přípravku.*

GEDEON RICHTER

GlobiFer® forte
železo s přírodním hemoglobinem

DÁVKOVÁNÍ 1-2 TABLETY DENNĚ | DOPLŇKĚ STRAVY

**Chcete užívat železo s výbornou
vstřebatelností bez zácpy nebo průjmu?**



**Výhody železa
s hemoglobinem**

- Lehce vstřebatelné (až 50%)
- Bez trávicích obtíží
- Lze užívat kdykoliv během dne
- Vstřebávání není ovlivněno jídlem, léky a tekutinami
- Ideální pro těhotné i kojící ženy



www.globifer.cz

GEDEON RICHTER