

**Tab. 1.** Volně dostupné registrované léčivé přípravky a zdravotnické prostředky k léčbě IDMC na českém trhu (17, 18)

| Název                                                                    | Účinná složka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dávkování, způsob použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kontraindikace (KI), použití při těhotenství a kojení                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canephron tbl. obd. 60<br>BIONORICA SE                                   | Jedna obalená tableta obsahuje:<br>18 mg Centaurium erythraea Rafn. s.l., herba (zeměžlučová nať)<br>18 mg Levisticum officinale Koch, radix (libečkový kořen)<br>18 mg Rosmarinus officinalis L., folium (rozmarýnový list)                                                                                                                                                                                             | Vhodné pro dospělé pacienty:<br>Dospělý: 3x denně 2 tablety, tablety se polykají vcelku a zapíjejí tekutinou.                                                                                                                                                                                                                  | KI: Hypersenzitivita na léčivé látky či rostliny z čeledi Apiaceae, aktivní peptické vředy, snížená funkce ledvin, kardiální či renální edémy.<br>Nedoporučuje se při těhotenství a kojení.                         |
| Rowatinex cps.mol.50<br>Rowatinex cps.mol.20<br>ROWA Pharmaceuticals Ltd | 1 měkká tobolka obsahuje:<br>Pinenum α 24,8 mg Pinenum β 6,2 mg<br>Camphenum 15,0 mg Cineolum 3,0 mg<br>Fenonum 4,0 mg Borneolum 10,0 mg<br>Anetholum 4,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                             | Dospělí: 3 až 4x denně 1 tobolku před jídlem.<br>Děti od 6 do 14 let: 1 až 2x denně 1 tobolku před jídlem.                                                                                                                                                                                                                     | KI nejsou známy, není vhodný pro pacienty s těžkými a opakovanými kolikami, anurií a při těžkých a recidivujících infekcích močových cest.<br>Neměl by být podáván v prvním trimestru těhotenství a po dobu kojení. |
| Rowatinex por.gtt.<br>sol.10ml<br>ROWA Pharmaceuticals Ltd               | 100 g roztoku obsahuje:<br>Pinenum α 24,8 g Pinenum β 6,2 g Camphenum 15,0 g Cineolum 3,0 g Fenonum 4,0 g<br>Borneolum 10,0 g Anetholum 4,0 g                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dospělí: 4 až 5x denně 3 až 5 kapek na kostku cukru nebo kousek sucharu před jídlem.<br>Děti od 6 do 14 let: 3 až 4x denně 1 až 2 kapky na kostku cukru, kousek sucharu nebo piškotu před jídlem.                                                                                                                              | KI nejsou známy, není vhodný pro pacienty s těžkými a opakovanými kolikami, anurií a při těžkých a recidivujících infekcích močových cest.<br>Neměl by být podáván v prvním trimestru těhotenství a po dobu kojení. |
| Species Urologicae<br>Planta spc.20 I<br>LEROs, s.r.o.                   | Jeden nálevový sáček obsahuje Složení: 1 nálev. sáček (1,5 g) Betulae folium (březový list) 0,413 g Uvae ursi folium (medvědicový list) 0,337 g Ononidis radix (jehlicový kořen) 0,150 g Petroselinii radix (petrželový kořen) 0,150 g Polygoni avic. herba (nať rdesna ptačího) 0,165 g Urticae herba (kopřivová nať) 0,150 g Millefolii herba (řebříčková nať) 0,105 g Sambuci nigrae flos (květ bezu černého) 0,030 g | 1 nálevový sáček (1,5 g) se přelije šálkem (¼ l) vařící vody a po 10 minutách vyluhování v přikryté nádobě se vyjme. Ke zvýšení účinku se doporučuje přidat k nálevu na špičku nože jedlou sodu. Čaj se pije teplý 3–5x denně. Přípravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím. Může způsobovat hnědé zabarvení moči.  | KI: Hypersenzitivita na léčivé látky přípravku. Otoky způsobené nedostatečnou funkcí srdce a ledvin, těhotenství, kojení, děti mladší než 12 let.                                                                   |
| Species Urologicae<br>Planta spc.1 IV<br>LEROs, s.r.o.                   | Jedno balení 100 g obsahuje Složení: 100,0 g Betulae folium (březový list) 27,5 g Uvae ursi folium (medvědicový list) 22,5 g Ononidis radix (jehlicový kořen) 10,0 g Petroselinii radix (petrželový kořen) 10,0 g Polygoni avic. herba (nať rdesna ptačího) 11,0 g Urticae herba (kopřivová nať) 10,0 g Millefolii herba (řebříčková nať) 7,0 g Sambuci nigrae flos (květ bezu černého) 2,0 g                            | 1 polévková lžice (5 g) se přelije šálkem (¼ l) vařící vody, po 15 minutách vyluhování se scedí. Pro zvýšení účinku se doporučuje přidat po vyluhování na špičku nože jedlou sodu. Čaj se pije teplý 3–5x denně. Přípravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím. Může způsobovat hnědé zabarvení moči.                | KI: Hypersenzitivita na léčivé látky přípravku. Otoky způsobené nedostatečnou funkcí srdce a ledvin, těhotenství, kojení, děti mladší než 12 let.                                                                   |
| Urcyston Planta<br>spc. 20 I<br>LEROs, s.r.o.                            | Složení: 1 nálev. sáček (1,5 g) 100,0 g Uvae ursi folium 0,375 g 25,0 g Equiseti herba 0,300 g 20,0 g Myrtilli herba 0,225 g 15,0 g Matricariae flos 0,150 g 10,0 g Sambuci nigrae flos 0,150 g 10,0 g Solidaginis herba 0,150 g 10,0 g Thymi herba 0,150 g 10,0 g                                                                                                                                                       | 1 nálevový sáček (1,5 g) se přelije šálkem (¼ l) vařící vody, a po 10 minutách vyluhování v přikryté nádobě se vyjme. Ke zvýšení účinku se doporučuje přidat k nálevu na špičku nože jedlou sodu. Čaj se pije teplý 3–5x denně. Přípravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím. Může způsobovat hnědé zabarvení moči. | KI: Hypersenzitivita na léčivé látky přípravku. Otoky způsobené nedostatečnou funkcí srdce a ledvin, těhotenství, kojení, děti mladší než 12 let.                                                                   |
| Utipro plus<br>Novintethical Pharma SA                                   | Kombinace želatiny, xyloglukanu, propolisu a ibišku súdánského (Hibiscus sabdariffa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dospělý (nad 14 let): Příznaky infekce: 2 kapsle po dobu 5 dní.<br>Preventivní podání: 1 kapsle denně minimálně 15 po sobě jdoucích dní v měsíci.<br>Kapsli spolknout a zapít vodou.                                                                                                                                           | KI: Hypersenzitivita na léčivé a pomocné látky.<br>Nedoporučuje se v těhotenství a prvních měsících kojení.                                                                                                         |
| Utipro plus AF<br>Noventure, SL                                          | Složení: 1 kapsle<br>Želatina 50 mg, xyloglukan 100 mg, propolis 100 g, ibišek súdánský (Hibiscus sabdariffa) 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dospělý (nad 14 let): Příznaky infekce: 2 kapsle po dobu 5 dní (1 kapsle po 12 hodinách).<br>Preventivní podání: 1 kapsle denně minimálně 15 po sobě jdoucích dní v měsíci.<br>Kapsli spolknout a zapít vodou.                                                                                                                 | KI: Hypersenzitivita na léčivé a pomocné látky.<br>Nedoporučuje se v těhotenství a prvních měsících kojení.                                                                                                         |

s rizikem krystalurie, např. sulfonamidy, amoxicilin, chinolony, aciklovir, inhibitory proteáz (indinavir, nelfinavir, atazanavir), methotrexát aj., a urolithiázy, např. diure-

tika, vysoké dávky kyseliny askorbové, kortikoidy, léčiva vedoucí k hyperkalcemii, léčiva působící hyperurikemií, abúzus laxativ aj. (6, 7). Retence moči může být způsobena

léčivý s anticholinergním efektem či léčivý ovlivňujícími vyprazdňovací reflexy. Je třeba si uvědomit, že poruchy mikce kromě antipsychotik a antidepresiv mohou způsobit